

Jak můžeme ošetřovat letošní oddělek


Schéma - základní varianta je zpracováno tak, aby se manipulovalo co nejméně s jednotlivými plásty, ale s celými nástavky a zásahy byly co nejjednodušší.

1. Dbáme na to, by oddělek nebyl vyloupen
2. Oddělek přikrmujeme pokud není snůška
3. Rozšíření se snažíme načasovat tak, aby se vylíhly včely z předchozího plodového cyklu. Proto je dobře znát datum začátku kladení matky.
4. Očka necháme po celou dobu uzavřena
5. Nejlépe je použít nízké dno
6. Použijeme-li vysoké dno, necháme hlavní česno uzavřeno a otevřeme očko. Hlavní česno otevřít až při plném ovládnání celého prostoru úlu. Pozor na loupež!
7. Česno můžeme pootevřít až když včely v oddělků obsedají na černo 2 nástavky.
8. Krmítko umístíme co nejdále od česna, krmivo dáváme večer po ukončení letu.
9. Oddělek zbytečně nerušíme, prohlídku děláme v době mimo hlavní let včel.
10. Po dokončení krmení nezapomeneme oddělek ošetřit proti V.d., protože přikrmováním byl v oddělků velký nárůst plodu v době, kdy se roztoč ve včelstvech šíří především zalétáváním a slíděním.
11. Oddělek, který byl utvořen ze včelstva (nebo dostal matku) částečně odolného V.d., by měl hravě přečkat zimu i bez ošetření. Každopádně je pro vyhodnocování zdravotního stavu včelstev třeba sledovat poškození včel a pro orientační stav V.d. používat celoročně monitorovací podložky.
12. Oddělek rozšiřujeme vždy, když včely "na černo" obsedají původní prostor (nástavky).




Pořízení oddělků

- 3 zavíčkované plásty plodu ■
- včely na 5 plástech
- zásoby ■
- obsazeno včelami včely




Úprava po převezení

- vložit stavební trámky (ST) ■
- nebo mezistěny (MZ) ■
- mírně krmít ■
- nízké dno
- česno zúžené nebo jen očko ○




Stav po 1. měsíci

- vystavěno □
- plod zdvojnásoben ■
- včel celý nástavek (N)
- česno rozšířeno (dle slídivosti)



Úpravy


- rozšíření ST nebo MZ
- stále přikrmovat
- česno zúžené, pozor na slídění
- roztržením plodu navodíme situaci, kdy se oddělek bude snažit plod scelit rychlým vystavěním ST či MZ




Stav po 1. měsíci

- plod zdvojnásoben,
- včely ve dvou N
- stavba dokončena, na krajích by měla být trubčina pokud jí včely staví


cca 1.8. - varianta A



cca 1.8. - varianta B



cca 1.8. - varianta C



Úpravy - varianta A

- rozšíření ST nebo MZ opět roztrhne plod, včely instinktivně scelí plodové hnízdo a ve 3.N rychleji dostaví dílo
- doplnit zásoby na zimní objem
- pozor na slídění, krmivo večer
- česno necháme zúžené
- očka neotevíráme ●

Varianta B

- spočívá v tom, že se plásty 1 a 10 z N č.1. přesunou do stejných pozic do N č.3 a do uvolněných míst N č.1 se vloží ST pro jarní stavbu trubčiny

Varianta C

- obsahuje ještě to, že se při témž zákroku (var.B) plodové plásty v č. 2 srazí (po odejmutí těch dvou do č. 3) a ST rámky se dají znovu do pozic 1 a 10 nástavku č. 2.

Konečný stav začátkem září

- vše vystavěno
- připraveno na zimu

cca 10.9.

- po dokončení krmení vložíme KM ■ na dlouhodobém nosiči
- vložíme podložky pokud je nepoužíváme celoročně